

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não existem relatos de reações adversas na utilização de STODAL.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não existem relatos de casos de superdosagem durante a utilização do medicamento STODAL.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. – 1.6916.xxxx.xxx-x

Farm. Resp.: Dra. Maria Isabel de Almeida Prado CRF-SP nº 8111

Fabricado por: **BOIRON S.A.**

2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy – FRANÇA

Registrado, Importado e Distribuído por:

BOIRON

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS LTDA.

Rua Joaquim Floriano,
1120, conj. 41 – 04534-000
São Paulo –SP CNPJ 07.498.711/0001-87
www.boiron.com.br

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em (dia/mês/ano).



Drosera 3 CH + Associação

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

APRESENTAÇÕES

STODAL xarope, em frasco de vidro de 150 ml.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

<i>Drosera 3 CH</i>	10 ml
<i>Arnica montana 3 CH</i>	10 ml
<i>Belladonna 3 CH</i>	10 ml
<i>Cina 3 CH</i>	10 ml
<i>Coccus cacti 3 CH</i>	10 ml
<i>Corallium rubrum 3 CH</i>	10 ml
<i>Cuprum 3 CH</i>	10 ml
<i>Ferrum phosphoricum 3 CH</i>	10 ml
<i>Ipeca 3 CH</i>	10 ml
<i>Solidago virga aurea 1 CH</i>	10 ml
Excipientes q.s.p	100 ml
Excipientes: benzoato de sódio, ácido cítrico monohidratado, solução de sacarose e água purificada.	

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

STODAL é indicado como auxiliar no tratamento da tosse seca ou produtiva; por promover o alívio da irritação da garganta ou por diminuir a viscosidade das secreções facilitando a expectoração.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.



BOIRON®



0800 724 5858

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As substâncias utilizadas na fabricação dos medicamentos homeopáticos são experimentadas em indivíduos sadios e desenvolvem determinados sinais e sintomas que revelam seu potencial medicamentoso. A preparação em doses mínimas dos medicamentos homeopáticos, a partir dessas substâncias, objetiva a ação inversa à provocada na experimentação.

A Homeopatia está baseada na Lei da cura que afirma: “O semelhante pode curar o semelhante”. Assim, as substâncias que provocam estes sintomas da tosse, são utilizadas em doses homeopáticas para auxiliar o tratamento deste distúrbio.

A ação do medicamento homeopático é imediata, as doses devem ser repetidas até o desaparecimento completo dos sintomas.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar este produto se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião dentista.

Atenção diabéticos: Este medicamento contém SACAROSE (Açúcar).

Este medicamento contém:

- 2,1 g de sacarose por dose de 2,5 ml;
- 4,2 g de sacarose por dose de 5 ml;
- 12,6 g de sacarose por dose de 15 ml.

Consulte seu médico caso você tenha doença crônica dos brônquios ou dos pulmões.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve armazenar STODAL em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Solução límpida de coloração amarelo claro.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletro magnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Posologia sugerida:

Você deve utilizar o copo-medida nas doses indicadas abaixo:

Adultos: você deve tomar, por via oral, 1 dose de 15 ml 2 a 3 vezes ao dia.

Crianças maiores de 5 anos: você deve administrar à criança, por via oral, 1 dose de 5 ml 2 a 3 vezes ao dia.

Crianças menores de 5 anos: você deve administrar à criança, por via oral, 1 dose de 2,5 ml 2 a 3 vezes ao dia.

Se os sintomas persistirem por mais de 5 dias, consulte seu médico.

No caso de adultos, não utilizar mais que 45 ml por dia.

No caso de crianças maiores que 5 anos, não utilizar mais que 15 ml por dia.

No caso de crianças menores que 5 anos, não utilizar mais que 7,5 ml por dia.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar os sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você pode administrar STODAL assim que se lembrar. Não exceda a dose recomendada para cada dia.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.